

Information destinée aux patients

Ceclor[®] retard

ALFASIGMA

Ceclor[®] retard comprimés filmés de 375 mg / 500 mg / 750 mg

Qu'est-ce que Ceclor retard et quand doit-il être utilisé ?

Ceclor retard est un antibiotique de la classe des céphalosporines, actif dans les infections bactériennes. Ceclor retard est utilisé dans le traitement des affections suivantes, si les agents pathogènes sont sensibles au principe actif : infections pulmonaires, bronchiques, pharyngées, amygdalites, sinusites, otites moyennes, infections cutanées et des parties molles et cystites.

Ceclor retard ne devra être utilisé que sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin pour le traitement de la maladie que vous présentez actuellement.

L'antibiotique contenu dans Ceclor retard n'est pas actif sur tous les germes qui provoquent des maladies infectieuses. L'emploi d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut causer des complications. N'utilisez donc jamais de votre propre chef un antibiotique pour le traitement d'une autre maladie et ne transmettez pas le médicament à d'autres personnes.

Quand Ceclor retard ne doit-il pas être utilisé ?

Ceclor retard ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue ou présumée aux antibiotiques de la famille des céphalosporines, aux pénicillines, à certains autres antibiotiques ou à d'autres composants de Ceclor retard. Une hypersensibilité se manifeste par ex. par de l'asthme, une détresse respiratoire, des troubles circulatoires, des gonflements au niveau de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses ou par des éruptions cutanées.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?

Ce médicament peut provoquer des vertiges, affectant la capacité de réaction, de conduite et d'utilisation d'outils ou de machines.

Si vous souffrez d'allergies à d'autres médicaments, d'asthme, de rhume des foins ou d'urticaire, parlez-en à votre médecin avant le traitement. Si vous éprouvez des difficultés respiratoires, une sensation d'oppression thoracique, un gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, des éruptions cutanées au cours du traitement, informez votre médecin ou votre pharmacien immédiatement avant de continuer le traitement Ceclor retard.

Si vous présentez une diarrhée grave, vous devez en informer immédiatement votre médecin. Les médicaments pour le traitement de la diarrhée, qui inhibent le péristaltisme intestinal (mouvement intestinal), ne doivent pas être utilisés.

En cas de symptômes inflammatoires du foie ou de jaunisse, tels que fatigue, faiblesse, malaise, perte d'appétit, nausées, vomissements, jaunissement des yeux (conjonctive), peau ou selles décolorées, informez votre médecin immédiatement avant de poursuivre le traitement par Ceclor retard.

Certains médicaments peuvent agir sur les effets de Ceclor retard. Il s'agit, dans le cas particulier, d'autres antibiotiques lors de l'administration desquels il peut se produire une majoration ou une réduction des effets de Ceclor retard.

Lorsque vous prenez un contraceptif oral (« pilule »), son efficacité peut être diminuée par Ceclor retard. Il convient dès lors de prendre une mesure contraceptive supplémentaire.

Ceclor retard doit être utilisé avec prudence chez les insuffisants rénaux.

Le probénécide (préparation contre la goutte) a un effet inhibiteur sur l'élimination par les reins de Ceclor retard, comme sur celle d'autres bêtalactamines.

Si vous prenez des médicaments contenant le principe actif probénécide (pour le traitement de la goutte), des médicaments réduisant l'acidité de l'estomac (par exemple, des antiacides contenant de l'hydroxyde de magnésium et d'aluminium), d'autres antibiotiques (notamment des antibiotiques du groupe des soi-disant aminoglycosides ou des substances actives telles que la colistine, la polymyxine B, la vancomycine ou le chloramphénicol), ou les contraceptifs oraux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Des cas de réactions cutanées particulièrement graves, potentiellement mortelles, ont été rapportés après la prise de Ceclor retard. Les signes de telles réactions cutanées sont :

- Symptômes pseudo-grippaux et fièvre
- Démangeaison de la peau
- Réactions des muqueuses (telles que gonflement de la muqueuse de la bouche ou de la gorge, cloques, saignements)
- Gonflement du visage ou d'autres parties du corps

Si vous présentez ces symptômes après avoir pris Ceclor retard, vous devez arrêter le traitement et contacter immédiatement un médecin.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Ceclor retard peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Si vous êtes enceinte, si vous prévoyez de l'être ou si vous allaitez, vous devez absolument en informer votre médecin ou votre pharmacien. C'est à votre médecin ou votre pharmacien de décider de l'emploi du médicament lors de grossesse ou d'allaitement.

Comment utiliser Ceclor retard ?

Respecter très exactement la posologie quotidienne et la durée du traitement prescrites par le médecin. Poursuivre le traitement par les antibiotiques, une fois débuté, pendant la durée indiquée par le médecin. Les symptômes de la maladie disparaissent souvent avant la guérison complète de l'infection. Une durée insuffisante ou un arrêt trop précoce du traitement peuvent donner lieu à une nouvelle poussée de la maladie.

Sauf avis contraire de votre médecin, les doses suivantes sont généralement appliquées :

Adultes et enfants âgés de plus de 12 ans :

La posologie habituelle est de 375 à 750 mg 2 fois par jour.

Pharyngites, amygdalites, infections cutanées : 375 mg 2 fois par jour.

Cystites : 375 mg 2 fois par jour ou 500 mg le soir.

Pneumopathies légères à moyennement sévères : 750 mg 2 fois par jour.

Sinusite : 750 mg 2 fois par jour (durée du traitement 10 jours).

Ne pas dépasser une posologie quotidienne de 4 g.

Enfants de moins de 12 ans :

Les comprimés pelliculés de Ceclor retard ne conviennent pas au traitement des enfants de moins de 12 ans.

Avaler les comprimés filmés sans les mâcher au cours des repas.

Pour les patients présentant une insuffisance rénale sévère, une réduction de dose peut être prescrite par le médecin.

Ne modifiez pas vous-même le dosage prescrit. Si vous pensez que l'efficacité du médicament est trop faible ou trop puissante, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Ceclor retard peut-il provoquer ?

La prise de Ceclor retard peut provoquer les effets secondaires suivants :

Effets secondaires fréquents :

Réactions allergiques cutanées telles que des rougeurs, des démangeaisons, papules prurigineuses (urticaire), des éruptions cutanées ; lourdeurs d'estomac, nausées, vomissements, perte d'appétit, ballonnements, selles molles ou diarrhée.

Si une diarrhée persistante grave survient pendant ou après le traitement, contactez immédiatement votre médecin (voir aussi « *Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?* »).

Effets secondaires occasionnels :

Hyperactivité temporaire, nervosité, insomnie ou somnolence, confusion, vertiges et hallucinations.

Symptômes cutanés sévères avec des réactions générales mettant la vie en danger (voir également « *Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?* »), modifications de la formule sanguine (diagnostiquée par le médecin), œdèmes, fièvre médicamenteuse, vaginite (inflammation du vagin), réactions ressemblant à une maladie du sérum telles que des éruptions cutanées avec problèmes articulaires et souvent de la fièvre, une hypersensibilité aiguë sévère telle qu'un œdème facial, un gonflement de la langue, un gonflement du larynx interne avec une constriction des voies respiratoires, une chasse au cœur, un essoufflement (détresse respiratoire), une baisse de la pression artérielle jusqu'au choc menaçant le pronostic vital (voir aussi « *Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?* »).

Si des réactions allergiques se produisent avec Ceclor retard, informez votre médecin immédiatement. Il ou elle décide alors d'interrompre le traitement par Ceclor retard et, par la suite, de poursuivre le traitement avec des médicaments appropriés.

Hypertension transitoire, inflammatoire rénale.

Effets secondaires rares et très rares :

Changements dans le sang tels qu'anémie, changements de numération sanguine (par exemple neutropénie, thrombocytopenie, leucopénie), qui peuvent être détectés par le médecin. Inflammation temporaire du foie et jaunisse (voir « *Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?* »), excrétion de protéines par l'urine.

Diarrhée forte et persistante (voir aussi "Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ceclor retard ?").

Des cas de réactions cutanées graves ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention ?

La prise prolongée de Ceclor retard peut entraîner la prolifération exagérée des agents pathogènes non sensibles au médicament. Lors d'une surinfection en cours de traitement, votre médecin prendra des mesures appropriées.

Diabétiques

Chez les diabétiques, la détermination du sucre dans les urines peut donner lieu à un résultat à tort positif, si l'on utilise des méthodes de dosage qui se basent sur une réduction du cuivre (par exemple Fehling, Benedict, Clintest).

Dans ce cas, des tests enzymatiques devrait être appliqués.

Remarques concernant le stockage

Le médicament ne peut être utilisé que jusqu'à la date de péremption gravée sur l'emballage avec l'expression « EXP ». Conserver le médicament à température ambiante (15 à 25°C), à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.

Une fois le traitement terminé, rapportez le reste du contenu du médicament à votre médecin ou à votre pharmacien pour que celui-ci pourvoie à une destruction appropriée.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien qui disposent d'une information spécialisée, destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Ceclor retard ?

1 comprimé filmé contient : 375, 500 ou 750 mg de céfaclor sous forme de céfaclor monohydrate, colorant E132 (indigotine) ainsi que des adjuvants.

Numéro d'autorisation

52179 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Ceclor retard? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Comprimés filmés de 375 mg : 20*

Comprimés filmés de 500 mg : 20*

Comprimés filmés de 750 mg : 20*

Titulaire de l'autorisation

Alfasigma Schweiz SA, Zofingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).