Informazioni destinata ai pazienti

Ceclor® retard

ALFASIGMA

Ceclor® retard compresse filmate da 375 mg / 500 mg / 750 mg

Che cos'è il Ceclor retard e quando si usa?
Il Ceclor retard è un antibiotico del gruppo delle cefalosporine attivo contro infezioni batteriche. Il Ceclor retard è indicato per il trattamento di malattie nelle quali l'agente patogeno è sensibile al principio attivo, e cioè: infezioni di polmoni, bronchi, faringe, tonsille, parotidi, orecchio medio, pelle e parti molli nonché vie urinarie.
Ceclor retard deve essere preso solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?
Questo farmaco le è stato prescritto dal medico per il trattamento della sua attuale malattia.
L'antibiotico contenuto nel Ceclor retard non è attivo contro tutti i tipi di microrganismi infettivi. La somministrazione di un antibiotico scelto in modo inadeguato o mal dosato può causare complicazioni. Eviti quindi di usarlo di sua propria iniziativa per il trattamento di altre malattie o di altre persone.

Quando non si può assumere Ceclor retard?
Il Ceclor retard non deve essere assunto in caso di ipersensibilità accertata o sospetta verso gli antibiotici del gruppo delle cefalosporine, la penicillina, certi altri antibiotici o verso un'altra sostanza contenuta nel Ceclor retard. L'ipersensibilità si manifesta ad es. con asma, affanno, disturbi circolatori, gonfiori della pelle e delle muscose o eruzioni cutanee (ad es. orticaria).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard?

Questo medicamento può causare capogiri e quindi ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di manovrare attrezzi o macchine.

Informi il medico prima del trattamento se soffre di allergie ad altri farmaci, di asma, raffreddore da fieno o orticaria. In caso di difficoltà respiratorie, sensazione di costrizione al petto, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzioni cutanee durante il trattamento, informi immediatamente il suo medico o il farmacista prima di continuare la terapia con Ceclor retard.

Se manifesta grave diarrea, informi immediatamente il medico. I farmaci per il trattamento della diarrea, che inibiscono la peristalsi intestinale (movimento dell'intestino), non devono essere usate.

Se si manifestano sintomi di infiammazione del fegato o ittero, siccome stanchezza, debolezza, malessere, perdita di appetito, nausea, vomito, ingiallimento degli occhi (congiuntiva), pelle o feci scolorite, informi immediatamente il suo medico prima di continuare con la terapia con Ceclor retard.
Parecchi farmaci possono influenzare l'attività del Ceclor retard. In particolare, altri antibiotici che, nel caso vengano somministrati contemporaneamente, possono provocare un potenziamento o viceversa un indebolimento dell'azione del Ceclor retard.
La somministrazione concomitante di Ceclor retard con un anticoncezionale orale (la „pillola") può ridurre l'effetto contraccettivo di quest'ultimo. Per questa ragione, durante la terapia dovrebbe essere adottato un metodo anticoncezionale supplementare.
Il Ceclor retard deve essere somministrato con cautela ai pazienti con una funzionalità renale limitata.
Come avviene anche per altri antibiotici della classe beta-lattami, l'eliminazione renale viene inibita dal probenecid (farmaco per la cura della gotta).
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo dei farmaci contenenti il principio attivo probenecid (per il trattamento della gotta), farmaci che che si prendono per curare un'eccessiva secrezione di acido nello stomaco (ad es. antiacidi contenenti magnesio e idrossido di alluminio), altri antibiotici (specialmente

antibiotici del gruppo dei cosiddetti aminoglicosidi o con i principi attivi colistina, polimixina B, vancomicina o cloramfenicolo) o contraccettivi orali.
Dopo l'assunzione di Ceclor retard sono stati segnalati casi di reazioni cutanee particolarmente gravi, potenzialmente pericolose per la vita. I segni di tali reazioni cutanee sono:

- Sintomi simil-influenzali e febbre
- Eruzione cutanea
- Reazioni delle mucose (come gonfiore del rivestimento della bocca o della gola, vesciche, sanguinamento)
- Gonfiore del viso o di altre parti del corpo

Se manifesta questi sintomi dopo aver assunto Ceclor retard, deve interrompere il trattamento e contattare immediatamente un medico.

Informi il medico o il farmacista se soffre di altre malattie, è allergico o prende altri medicamenti sia ad uso interno che esterno (anche di propria iniziativa!)

Si può assumere Ceclor retard durante la gravidanza o l'allattamento?
Informi il suo medico se è incinta, se prevede una gravidanza o se allatta. Sarà il medico o il farmacista a decidere se potrà prendere il Ceclor retard durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Ceclor retard?
Bisogna attenersi scrupolosamente al dosaggio giornaliero ed alla durata di cura prescritti dal medico.
Una terapia con antibiotici deve essere portata avanti per tutto il tempo che il medico ha ordinato. Spesso, i sintomi di una malattia scompaiono prima che l'infezione sia completamente guarita. Una durata insufficiente o la sospensione prematura del trattamento possono avere come conseguenza una ricaduta.
Salvo diversa prescrizione del medico, generalmente si utilizzano le dosi seguenti:
<u>Adulti e ragazzi oltre i 12 anni:</u>
La dose usuale è di 375 – 750 mg due volte al giorno.
Infezione della mucosa orale, infiammazione delle tonsille, infezioni cutanee: 375 mg due volte al giorno.
Cistiti: 375 mg due volte al giorno oppure 500 mg la sera.
Infiammazioni polmonari di leggera o di media intensità: 750 mg due volte al giorno.
Sinusite: 750 mg due volte al giorno (durata della terapia: 10 giorni).
Non si deve oltrepassare una dose giornaliera massima di 4 g.
<u>Bambini sotto i 12 anni:</u>
Le compresse rivestite con film di Ceclor retard non sono indicate per il trattamento di bambini sotto i 12 anni.
Le compresse rivestite con film vengono deglutite intere durante i pasti.
Ai pazienti con forte limitazione della funzionalità renale è possibile che il medico prescriva una riduzione del dosaggio.
Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli con il suo medico o il suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Ceclor retard?
I seguenti effetti collaterali possono manifestarsi durante l'assunzione di Ceclor retard:
Effetti collaterali comuni:
Reazioni allergiche della pelle come macchie rosse, prurito, ponfi pruriginosi (orticaria), eruzioni cutanee; pressatura dello stomaco, nausea, vomito, perdita di appetito, flatulenza, feci morbidi o diarrea.
In caso di diarrea grave e persistente durante o dopo la terapia, contatti immediatamente il suo medico (vedere anche "*Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard"?*).

Effetti collaterali occasionali:
Iperattività temporanea, nervosismo, insonnia o sonnolenza, confusione, vertigini e allucinazioni.
Gravi reazioni della pelle accompagnate da reazioni generalizzate pericolose per la vita
(vedere anche "*Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard"?*), cambiamenti dell'emocromo (che il medico determina), edema, febbre da farmaci, vaginite (infiammazione della vagina), reazioni simili alla malattia da siero, come eruzione cutanea con disturbi articolari e spesso febbre, gravi sintomi d'ipersensibilità acuta come edema del viso, gonfiore della lingua o della laringe interna con restringimento delle vie respiratorie, tachicardia, mancanza di respiro (dispnea), abbassamento della pressione sanguigna fino allo shock minacciando la vita (vedere anche "*Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard"?*).
In caso di reazioni allergiche a Ceclor retard, informi immediatamente il medico. Lui decide dell'interruzione di Ceclor retard e del proseguimento del trattamento con farmaci adeguati.
Infiammazione renale, ipertensione transitoria.
Effetti collaterali rari e molto rari:
Cambiamenti nel sangue come l'anemia, alterazioni del quadro ematologico (ad es. neutropenia, trombocitopenia, leucopenia), che possono essere rilevati dal medico. Infiammazione temporanea del fegato e ittero (vedere anche "*Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard"?*), escrezione delle proteine urinarie.
Diarrea forte e persistente (vedere anche "*Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Ceclor retard"?*).
Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi.
Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?
La somministrazione prolungata del Ceclor retard può portare all'aumento degli agenti patogeni non sensibili. Se nel corso della terapia insorge una sovrainfezione, il suo medico adotterà le misure adeguate.

Diabetici
Nei diabetici, le analisi dello zucchero nelle urine possono risultare erroneamente positive se si usano metodi basati sulla riduzione del rame (ad es. Fehling, Benedict, Clintest).
In questo caso dovrebbero essere applicati dei test enzimatici.

Istruzioni per la conservazione
Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.
Conservare a temperatura ambiente (15 – 25°C), protetto dalla luce e fuori della portata dei bambini. Una volta terminato il trattamento, la confezione con il contenuto residuo dovrà essere riportata al medico o al farmacista affinché venga eliminata in modo corretto.
Il medico e il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Ceclor retard?
Una compressa contiene 375, 500 o 750 mg di cefaclor sotto forma di cefaclor monoidrato, colorante E132 (= indigotina), nonché adiuvanti.

Numero dell'omologazione
52179 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Ceclor retard? Quali confezioni sono disponibili?
In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.
Compresse filmate da 375 mg: 20*
Compresse filmate da 500 mg: 20*
Compresse filmate da 750 mg: 20*

Titolare dell'omologazione
Alfasigma Schweiz SA, Zofingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2020 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).