



Emri i pacientit

Data dhe ora e ekzaminimit tuaj

Mjeku juaj ju ka rekomanduar Clensia si preparat për zorrët për një ekzaminim të ardhshëm.

Një paketë Clensia përmban 4 bustina të mëdha dhe 4 të vogla. Aroma e limonit të gjelbër e Clensia e bën të këndshëm përdorimin e saj. Ju lutemi të ndiqni këto udhëzime për t'u siguruar që t'ju pastrohen mirë zorrët dhe ekzaminimi të kryhet pa vështirësi.

Të paktën 3 ditë përpara ekzaminimit kaloni në dietë me lloje ushqimesh me nivel të ulët fibrash, si më poshtë:

- Biskota të thata ose peksimadhe (jo integrale) me gjalpë ose margarinë.
- Xhel, mjaltë ose reçel (pa bërthama).
- Mish pa dhjamë (mish lope, filetë derri, pulë, mish viçi, lepur, gjoks gjeldeti, proshutë e zier), peshk ose vezë.
- Oriz, makarona (jo integrale) ose kuskus me gjalpë ose margarinë.
- Supë (vetëm supë me lëng mishi dhe perime).
- Ujë, kafe (pa qumësht apo ajkë) ose çaj me sheqer.



Shënim: Jo sallata, bishtajore, fruta (përveç bananeve) ose perime (përveç karotave të qëruara dhe të ziera)




Data/vula e mjekut

Nëse keni ndonjë pyetje për rreziqet dhe efektet anësore, ju lutemi të lexoni fletushkën e paketimit dhe të konsultoheni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Përgatitja dhe përdorimi i Clensia

Si ta përgatisni Clensia

 = solucioni Clensia

 = lëng i kthjellët

Doza e parë



Doza e dytë



- Treni **2 bustina të mëdha** dhe **2 bustina të vogla** në 1 l ujë.
- Përgatisni **të paktën ½ l** lëng të kthjellët, si p.sh. ujë ose çaj (pa qumësht) për **çdo dozë solucioni 1 l Clensia**.


Si ta përdorni Clensia



Mos konsumoni ushqime të ngurta pasi të keni filluar përdorimin e Clensia.



Mos pini asgjë për 2 orë përpara ekzaminimit.



Koha e dozës së parë

Koha e dozës së dytë

Koha e kolonoskopisë

- Pini **250 ml solucioni Clensia** çdo 15 deri në **20 minuta**.
- **Pas çdo litri solucioni Clensia, pini dhe ½ l lëng të kthjellët.**
- **NUK duhet të pini asnjë lëng** (duke përfshirë preparatet për lavazhin e zorrëve) për 2 orë përpara kolonoskopisë.

FULL-DOSE