



Emri i pacientit

Data dhe ora e ekzaminimit tuaj

### **Mjeku juaj ju ka rekomanduar Clensia si preparat për zorrët për një ekzaminim të ardhshëm.**

Një paketë Clensia përmban 4 bustina të mëdha dhe 4 të vogla. Aroma e limonit të gjelbër e Clensia e bën të këndshëm përdorimin e saj. Ju lutemi të ndiqni këto udhëzime për t'u siguruar që t'ju pastrohen mirë zorrët dhe ekzaminimi të kryhet pa vështirësi.

### **Të paktën 3 ditë përpara ekzaminimit kaloni në dietë me lloje ushqimesh me nivel të ulët fibrash, si më poshtë:**

- Biskota të thata ose peksimadhe (jo integrale) me gjalpë ose margarinë.
- Xhel, mjaltë ose reçel (pa bërthama).
- Mish pa dhjamë (mish lope, filetë derri, pulë, mish viçi, lepur, gjoks gjeldeti, proshutë e zier), peshk ose vezë.
- Oriz, makarona (jo integrale) ose kuskus me gjalpë ose margarinë.
- Supë (vetëm supë me lëng mishi dhe perime).
- Ujë, kafe (pa qumësht apo ajkë) ose çaj me sheqer.




**Shënim:** Jo sallata, bishtajore, fruta (përveç bananeve) ose perime (përveç karotave të qëruara dhe të ziera)

Data/vula e mjekut

# Përgatitja dhe përdorimi i Clensia

## Si ta përgatisni Clensia

 = solucion Clensia

 = lëng i kthjellët

### Doza e parë



### Doza e dytë



- Treni **2 bustina të mëdha** dhe **2 bustina të vogla** në 1 l ujë.
- Përgatisni **të paktën ½ l** lëng të kthjellët, si p.sh. ujë ose çaj (pa qumësht) për **çdo dozë solucion 1 l Clensia**.


## Si ta përdorni Clensia



Mos konsumoni ushqime të ngurta pasi të keni filluar përdorimin e Clensia.



Mos pini asgjë për 2 orë përpara ekzaminimit.



Koha e dozës së parë

Koha e dozës së dytë

Koha e kolonoskopisë

- Pini **250 ml solucion Clensia** çdo 15 deri në **20 minuta**.
- Pas çdo litri solucion Clensia, pini dhe **½ l lëng të kthjellët**.
- **NUK duhet të pini asnjë lëng** (duke përfshirë preparatet për lavazhin e zorrëve) për 2 orë përpara kolonoskopisë.

SPLIT-DOSE