

Інформація для пацієнтів стосовно препарату Clensia для проведення колоноскопії

SPLIT-DOSE



Прізвище пацієнта

Дата та час Вашого обстеження

Лікар призначив Вам препарат Clensia для підготовки кишечника до запланованого обстеження.

Одна упаковка Clensia містить 4 великих та 4 малих саше. Завдяки аромату лайма препарат Clensia має приємний смак. Будь ласка, дотримуйтеся вказівок цієї інструкції, щоб добре очистити кишечник і цим забезпечити оптимальне проведення обстеження.

Принаймні за 3 дні до обстеження скоригуйте своє харчування, щоб воно містило такі продукти з низьким вмістом клітковини:

- сухе печиво або сухарі (не цільнозернові) з маслом або маргарином;
- желе, мед або варення (без кісточок);
- нежирне м'ясо (яловичина, свиняче філе, курятина, телятина, кроляче м'ясо, індича грудка, варена шинка), риба або яйця;
- рис, вироби з тіста (не цільнозернові) або кускус з маслом або маргарином;
- суп (лише овочевий бульйон);
- вода, кава (без молока або вершків) або чай з цукром.



Примітка: не їжте салати, бобові, фрукти (окрім бананів) або овочі (окрім чищеної відвареної моркви)


Дата / печатка лікаря

Якщо у Вас є запитання стосовно ризиків та побічних реакцій, прочитайте листок-вкладиш та зверніться до лікаря або фармацевта.

Clensia – приготування та прийом

Приготування

 = розчин Clensia

 = прозора рідина

Перший прийом



Другий прийом



- Розчиніть **2 великих** та **2 малих саше** в 1 л води.
- Для кожного прийому 1 л розчину Clensia підготуйте **принаймні ½ л** прозорої рідини, наприклад, води або чаю (без молока).


Прийом



Будь ласка, після того, як Ви розпочали прийом препарату Clensia, не вживайте тверду їжу!



Припиніть пити будь-яку рідину за 2 год до обстеження!



- Приймайте **250 мл розчину Clensia** кожні **15-20 хвилин**.
- Після прийому кожного літра розчину Clensia пийте **додатково ½ л прозорої рідини**.
- Протягом 2 годин перед проведенням колоноскопії **ЗАБОРОНЕНО вживати будь-яку рідину** (це також стосується й препаратів для очищення кишечника).

SPLIT-DOSE