

使用 Clensia 进行结肠镜检查： 患者须知

FULL-DOSE



患者姓名

检查日期和时间

您的医生给您开了 Clensia, 用于为即将进行的检查 做好肠道准备。

一包 Clensia 包含 4 大袋和 4 小袋内容物。Clensia 为酸橙味, 口感舒适。请遵守本说明, 充分清洁肠道, 使检查能够顺利进行。

至少在检查前 3 天将饮食改为以下低纤维食物:

- 抹黄油或人造黄油的饼干或烤面包片(非全麦)。
- 果冻、蜂蜜或果酱(不含籽)。
- 瘦肉(牛肉、猪排、鸡肉、小牛肉、兔肉、火鸡胸脯肉、熟火腿)、鱼或鸡蛋。
- 加黄油或人造黄油的米饭、面食(非全麦)或粗麦粉。
- 汤(仅蔬菜汤)。
- 水、咖啡(不加牛奶或奶油)或加糖的茶。



提示: 不得食用沙拉、豆类、水果(香蕉除外)或蔬菜(去皮且煮熟的胡萝卜除外)。



日期/医生印章

请阅读包装说明书并咨询医生或药剂师, 获取有关风险和副作用的相关信息。

Clensia - 准备和服用

准备工作

 = Clensia 溶液  = 透明液体

首次服用



第二次服用



- 将 **2 大袋** 和 **2 小袋** 本产品溶于 1 升水中。
- 每服用 1 升 Clensia 溶液, 至少准备 **1/2 升水** 或茶(不含牛奶)等透明液体。


服用



开始服用 Clensia 后请不要再进食任何固体食物!



检查前 2 小时不要喝任何东西!



首次服用时间

第二次服用时间

结肠镜检查时间

- 每 15 至 20 分钟 饮用 250 毫升 Clensia 溶液。
- 每饮用一升 Clensia 溶液后, 再饮用半升透明液体。
- 结肠镜检查前 2 小时不得**摄入任何液体**(同样适用于肠道清洁剂)。